

LEVOFLOXACINE (TAVANIC*) COMPRIME

Comment bien prendre la levofloxacine

Prenez les comprimés de levofloxacine avec de l'eau au moment d'un repas. Si vous avez des difficultés à avaler le comprimé, vous pouvez le couper en deux.

Si la prescription correspond à un comprimé et demi (750mg), vous pouvez conserver le demi-comprimé non utilisé, si possible dans l'emballage d'origine, pour la prise suivante.

Si vous oubliez de prendre ce médicament, prenez-le dès que vous vous en rendez compte. Si vous vous en apercevez à la prise suivante, ne prenez pas de dose double.

Très important !

Des examens au laboratoire d'analyses médicales vous sont prescrits. Vous devez impérativement faire ces examens qui permettent de vérifier que le traitement n'entraîne pas de complications.

N'arrêtez pas le traitement avant la date prévue, même si vous avez l'impression que ça va mieux. La bactérie est encore présente dans votre organisme et nécessite un traitement prolongé.

Soleil et UV

Le médicament peut provoquer une réaction sous l'effet d'une lumière forte. Ne vous exposez pas au soleil ou à des rayons UV artificiels (lampe à bronzer, solarium), portez un chapeau et des vêtements couvrants pendant le traitement et dans les trois jours qui suivent l'arrêt du traitement afin d'éviter une photosensibilisation qui peut être grave.

Grossesse

L'usage de ce médicament est à éviter pendant la grossesse. Contactez-nous si vous apprenez que vous êtes enceinte.

Arrêtez le traitement etappelez-nous (tel 01.49.95.65.65 puis poste 55237) ou contactez votre médecin traitant si vous avez un des signes suivants pendant le traitement :

Tendons

Douleur au niveau d'un tendon, en particulier de la cheville, éventuellement poignet, coude, épaule, genou. Douleur et gonflement au niveau des articulations.

Nerfs

Perte de sensibilité, sensation de brûlure, de fourmillement ou de picotement dans les bras ou les jambes, engourdissement, faiblesse musculaire.

Ventre

Des diarrhées modérées et sans gravité sont possibles et vous pouvez continuer à prendre le médicament. Mais si ces diarrhées deviennent très intenses, si vos selles contiennent du sang ou du mucus, si vous avez des douleurs ou de la fièvre, arrêtez le médicament et appelez-nous.

Cerveau

Crise d'épilepsie, confusion, troubles de la mémoire, hallucinations, cauchemars, pensées suicidaires.

Foie

Peau jaunâtre et démangeaisons, blanc des yeux jaunâtre, urines foncées associées à un manque d'appétit et des douleurs abdominales.

Yeux

Vision floue, trouble de la vision des couleurs, difficultés à voir les détails, réduction du champ visuel.

Oreilles

Modification de l'audition, impression d'entendre moins bien.

Consultez la notice qui se trouve dans la boite pour connaître les autres effets indésirables possibles.

Arrêtez le traitement et appelez le 15 (urgences médicales) si vous avez un des signes suivants très rares pendant le traitement :

Visage et cou

Gonflement rapide des lèvres, du visage, de la gorge, de la langue, difficulté à avaler ou à respirer (appelez le 15).

Peau

Boutons qui apparaissent brutalement sur le visage puis sur le corps, tâches rougeâtres sur le buste, cloques, fièvre, ganglions, douleur, ulcération de la bouche, gorge, nez, organes génitaux, yeux rouges et gonflés (appelez le 15).

Cœur et vaisseaux sanguins

Douleur soudaine et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos (appelez le 15).

Si vous posez une question, si vous ressentez un effet indésirable, appelez-nous ou parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ne prenez aucun autre médicament sans avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Gardez la notice qui se trouve dans la boite de médicament ; vous pourriez avoir besoin de la relire.

Octobre 2023